


SHIELDING EFFICIENCY



Recognizing The Difference

Curium is the ONLY North American generator manufacturer that offers Depleted Uranium as a shielding option.

Radiation Dose Comparison*



* measurement of mR/hr at 1 meter from package surface

Information on file at Curium, Maryland Heights, MO

As Low As Reasonably Achievable (A.L.A.R.A.) is more achievable with Curium's Depleted Uranium shielding.

When using 7.5 Ci generator as the reference standard, the shielding capabilities of Depleted Uranium are 5 times greater than lead. The graph illustrates the difference a DU shield can have on radiation safety.

INDICATIONS AND USAGE

Sodium Pertechnetate Tc 99m is used **IN ADULT PATIENTS** as an agent for: Thyroid Imaging, Salivary Gland Imaging, Urinary Bladder Imaging (direct isotopic cystography) for detection of vesico-ureteral reflux, and Nasolacrimal Drainage System Imaging (dacryoscintigraphy). It is used **IN PEDIATRIC PATIENTS** as an agent for: Thyroid Imaging and Urinary Bladder Imaging (direct isotopic cystography) for the detection of vesico-ureteral reflux.

IMPORTANT RISK INFORMATION

Please see accompanying package insert for full Important Risk Information.

INVESTMENT BY SHIELD TYPE



Investing In Safety

Our investment in depleted uranium helps improve your radiation safety program.

Curium has led the industry with significant investment in DU shields for our 5.0 Ci through 16.0 Ci generator offerings. This improved shielding can help provide you and your employees a low exposure alternative to lead.



Amount Invested Per Generator (\$)



Please see included Important Risk Information and accompanying package insert.

FOR MORE INFORMATION, CONTACT:

- Customer Service, 866.885.5988
- Product Monitoring, 866.789.2211
- www.curiumpharma.com

PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ
1 INDICATIONS
 Ultra-Technekow™ V4 (Sodium, lecuble de Perchlorate Tc-99m de Sodium) est une source de pertechnétate Tc-99m de sodium qui est utilisée dans la préparation de produits radiopharmaceutiques à usage diagnostique approuvés, tel que décrit sur l'étiquetage de ces produits, ou administré directement *in vivo*. Lorsque administré directement, le pertechnétate de sodium Tc-99m est indiqué pour :

Utilisation chez l'adulte pour :

- Imagerie de la glande thyroïde;
- Imagerie de la glande salivaire;
- Imagerie de la vessie (cystographie isotopique directe) pour la détection d'un reflux vésico-urétral;
- Imagerie du système de drainage nasolacrymal (dacryoscintigraphie).

Utilisation chez les patients pédiatriques pour :

- Imagerie de la glande thyroïde;
- Imagerie de la vessie (cystographie isotopique directe) pour la détection d'un reflux vésico-urétral.

1.1 Enfants

Enfants (moins de 18 ans): Après les données examinées par Santé Canada, l'innocuité et l'efficacité d'Ultra-Technekow V4 dans la population pédiatrique ont été démontrées. Par conséquent, Santé Canada a autorisé une indication d'utilisation dans la population pédiatrique (voir Section 1: INDICATIONS).

1.2 Personnes âgées

Personnes âgées (plus de 65 ans): Les données tirées des études cliniques et de l'expérience laissent entendre que l'utilisation du produit au sein de la population gérontique n'entraîne pas de différences en matière d'innocuité ou d'efficacité.

2 CONTR-INDICATIONS

La solution injectable de pertechnétate Tc-99m de sodium est contre-indiquée chez les patients qui présentent une hypersensibilité au produit, à un ingrédient de la formulation, y compris à un ingrédient non médical. Pour obtenir la liste complète des ingrédients, veuillez consulter la Section 6: FORMES POSOLOGIQUES, CONCENTRATIONS, COMPOSITION ET EMBALLAGE.

3 ENCADRÉ « MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES »

Mises en garde et précautions importantes
 Les produits radiopharmaceutiques ne doivent pas être utilisés que par des professionnels de la santé adéquatement qualifiés en ce qui a trait au recours des substances réglementées radioactives chez l'homme.

4 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

4.1 Considérations posologiques
 Le pertechnétate Tc-99m de sodium est administré par voie intraveineuse. Pour réaliser une imagerie du système de drainage nasolacrymal, installer le pertechnétate Tc-99m de sodium à l'aide d'une micropipette ou d'une autre méthode assurant l'exactitude de la dose.

Pour réaliser une imagerie de la vessie et des urètes (cystographie isotopique directe), administrer, de façon aseptique, le pertechnétate Tc-99m de sodium par instillation directe dans la vessie au moyen d'un cathétre urétrale. Ce dernier doit ensuite être purgé avec environ 200 ml de solution saline stérile directement dans la vessie.

4.2 Dose recommandée et modification posologique
 Les doses recommandées pour un patient adulte moyen (70 kg) en fonction des indications diagnostiques sont :

Indications chez les adultes	Doses recommandées (MBq)
Imagerie vésico-urétrale	18,5 à 37 (0,5 à 1 mCi)
Imagerie de la glande thyroïde	37 à 370 (1 à 10 mCi)
Imagerie de la glande salivaire	37 à 185 (1 à 5 mCi)
Système de drainage nasolacrymal	Dose maximale de 3,7 (100 µCi)

Les doses recommandées pour un patient pédiatrique en fonction des indications diagnostiques sont :

Indications chez les patients pédiatriques	Doses recommandées (MBq)
Imagerie vésico-urétrale	18,5 à 37 (0,5 à 1 mCi)
Imagerie de la glande thyroïde	2,22 à 2,96 (60 à 80 µCi) par kg de poids

4.3 Reconstitution

Aucune reconstitution n'est requise.

Produits parentéraux :

Si on utilise l'élut pour reconstituer une trousse radiopharmaceutique, la trousse radiomarquée devrait être utilisée dans les 12 heures suivant l'étauage du générateur ou avant la date d'expiration indiquée sur l'étiquette pour le produit reconstitué, selon la première éventualité. Se référer à la monographie de produit du produit à reconstituer.

4.4 Administration

Les doses administrées aux patients doivent être mesurées à l'aide d'un système d'étalonnage de dose radioactive approprié avant l'administration.

Avant l'administration, il faut examiner visuellement les produits administrés par voie parentérale, si la solution et le contenant le permettent, afin de déceler la présence de particules étrangères et toute décoloration. Si la solution est décolorée, cessez immédiatement d'utiliser le générateur. La solution qui doit être administrée au patient devrait être claire, incolore et exempte de particules.

4.5 Dose oubliée

Sans objet.

4.6 Réaction d'image et interprétation

Consulter la monographie de produit du produit utilisé pour la reconstitution.

4.7 Instructions pour la préparation et l'utilisation

Les composantes de la fiole de réaction sont stériles et aseptiques. Il est essentiel que l'utilisateur suive attentivement les instructions et adhère à une technique aseptique stricte.

4.8 Utilisation chez les patients pédiatriques

Utilisez une technique aseptique et portez des gants imperméables tout au long de la procédure de préparation.

Effectuez tous les transferts de solutions radioactives avec une seringue correctement blindée et maintenez une protection adéquate autour de la fiole durant la durée de vie utile du produit radioactif.

4.9 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.10 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.11 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.12 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.13 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.14 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.15 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.16 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.17 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.18 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.19 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.20 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.21 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.22 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.23 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.24 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.25 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.26 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.27 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.28 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.29 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.30 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.31 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.32 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.33 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.34 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.35 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.36 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.37 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.38 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.39 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.40 Utilisation chez les patients pédiatriques

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 10 mm ou moins (2,54 cm) de façon à réduire au minimum le risque de radioexposition du personnel.

4.41 Utilisation chez l'adulte

Évitez la livraison, placer le générateur dans un blindage en plomb d'une épaisseur de 1

PART I: HEALTH PROFESSIONAL INFORMATION

1 INDICATIONS

ULTRA-TECHNEKOW™ V4 (Sodium Pertechnetate Tc 99m Injection) is a source of sodium pertechnetate Tc 99m for use in the preparation of approved diagnostic radiopharmaceuticals as described in the labeling of these diagnostic radiopharmaceutical kits or administered directly *in vivo*. When administered directly, sodium pertechnetate Tc 99m is indicated for:

Use in adults for:

- Thyroid Imaging;
- Salivary Gland Imaging;
- Urinary Bladder Imaging (direct isotopic cystography) for detection of vesico-ureteral reflux;
- Nasolacrimal Drainage System Imaging (dacyroscintigraphy).

Use in pediatric patients for:

- Thyroid Imaging;
- Urinary Bladder Imaging (direct isotopic cystography) for the detection of vesico-ureteral reflux.

1.1 Pediatrics

Pediatrics (< 18 years of age): Based on the data submitted and reviewed by Health Canada, the safety and efficacy of Ultra-Technekow V4 in pediatric patients has been established. Therefore, Health Canada has authorized an indication for pediatric use (see Section 1 INDICATIONS).

1.2 Geriatrics

Geriatrics (> 65 years of age): Evidence from clinical studies and experience suggests that use in the geriatric population is not associated with differences in safety or effectiveness.

2 CONTRAINDICATIONS

Sodium pertechnetate Tc 99m Injection is contraindicated in patients who are hypersensitive to this drug or to any ingredient in the formulation, including any non-medical ingredient, or component of the container. For a complete listing, see Section 6 DOSAGE FORMS, STRENGTHS, COMPOSITION AND PACKAGING.

3 SERIOUS WARNINGS AND PRECAUTIONS BOX

Serious Warnings and Precautions

Radio pharmaceuticals should be used only by those health professionals who are appropriately qualified in the use of radioactive prescribed substances in or on humans.

4 DOSAGE AND ADMINISTRATION

4.1 Dosing Considerations

Sodium pertechnetate Tc 99m is administered by intravenous injection. When imaging the nasolacrimal drainage system, instill the sodium pertechnetate Tc 99m by the use of a device such as a microtip or similar method which will ensure the accuracy of the dose.

For imaging the urinary bladder and ureters (direct isotopic cystography), the sodium pertechnetate Tc 99m is administered by direct instillation aseptically into the bladder via a urethral catheter, following which the catheter is flushed with approximately 200 mL of sterile saline directly into the bladder.

4.2 Recommended Dose and Dosage Adjustment

The suggested dose ranges for the average adult patient (70 kg) based on diagnostic indications are:

Indications in adult patients	Suggested dose ranges (MBq)
Vesico-ureteral imaging	18.5 to 37 (0.5 to 1 mCi)
Thyroid gland imaging	37 to 370 (1 to 10 mCi)
Salivary gland imaging	37 to 185 (1 to 5 mCi)
Nasolacrimal drainage system	Maximum dose of 3.7 (100 µCi)

The suggested dose ranges for pediatric patients based on diagnostic indications are:

Indications for pediatric patients	Suggested dose ranges (MBq)
Vesico-ureteral imaging	18.5 to 37 (0.5 to 1 mCi)
Thyroid gland imaging	2.22 to 2.96 (60 to 80 µCi) per kg body weight

4.3 Reconstitution

No reconstitution is required.

Parenteral Products:

If the eluate is used to reconstitute a radiopharmaceutical kit, the radiolabeled kit should not be used after 12 hours from the time of generator elution or after the expiration time stated on the labeling for the reconstituted product, whichever is earlier. Please refer to the kit product insert for how to reconstitute the product.

4.4 Administration

The patient dose should be measured by a suitable radioactive dose calibration system prior to administration.

Parenteral products should be inspected visually for particulate and discolouration prior to administration whenever solution and container permit. If the solution is discoloured, discontinue use of the generator immediately. The solution to be administered as the patient dose should be clear, colourless, and contain no particulate matter.

4.5 Missed Dose

Not applicable.

4.6 Image Acquisition and Interpretation

Please refer to the monograph of the product with which it is reconstituted.

4.7 Instructions for Preparation and Use

The components of the reaction vial are sterile and non-pyrogenic. It is essential that the user follows the directions carefully and adheres to strict aseptic technique.

Directions for Quality Control

The following quality controls steps should be performed with the eluate following each elution of Ultra-Technekow V4 Generator:

1. Determine the technetium Tc 99m concentration and molybdenum Mo 99 content for dispensing purposes. The generator eluate may be assayed using an ionization chamber dose calibrator, scintillation detector or other appropriate detection system. The manufacturer's instructions for operation of the instrument/equipment should be followed for measurement of technetium Tc 99m and molybdenum Mo 99 activity.

2. Use a shielded syringe to withdraw patient dose or to transfer sodium pertechnetate Tc 99m into mixing vials during kit reconstitution and maintain adequate shielding during the useful life of the radioactive product.

NOTE: the acceptable molybdenum Mo 99 breakthrough limit is 0.15 kilocuries/milliliter Mo 99 content; megacurie technetium Tc 99m (0.15 microcurie molybdenum Mo 99 per millicurie technetium Tc 99m) per administered dose, at the time of administration (see USP, Sodium Pertechnetate Tc 99m Injection).

3. Use a shielded syringe to withdraw patient dose or to transfer sodium pertechnetate Tc 99m into mixing vials during kit reconstitution and maintain adequate shielding during the useful life of the radioactive product.

NOTE: the acceptable aluminum ion breakthrough limit is no more than 10 micrograms per milliliter of eluate (see USP, Sodium Pertechnetate Tc 99m Injection).

4.8 Radiation Dosimetry

The estimated absorbed radiation doses from an intravenous injection of various doses of sodium pertechnetate Tc 99m distributed uniformly in the total body of an average adult and pediatric patient are shown in Table 1 and 2, respectively (per International Commission on Radiological Protection (ICRP) 30 and 80).

Table 1: Adult Absorbed Radiation Doses (mGy) from Intravenous Injection.

Time After First Elution (hrs)	Approximate Yield (% of First Elution)	Effective Dose (mSv)
1	10	19
2	19	37
3	27	55
4	35	73
5	41	91
6	47	109

5 OVERDOSAGE

Effective Dose Equivalent (mSv/MBq) (rem/mCi): Not available

Effective Dose (mSv/MBq) (rem/mCi): 14

Table 2: Pediatric Absorbed Radiation Doses (mGy) from Intravenous Injection.

Age	15 years	10 years	5 years	1 year
Administered activity in MBq (mCi)	1110 (30)	740 (20)	555 (15)	370 (10)
Organ				
Adrenals	5.3	5.4	6.2	7.1
Urinary Bladder Wall	26	22	18	22
Bone Surfaces	7.6	7.5	8.1	10
Brain	2.8	3.1	3.7	4.5
Breasts	2.6	2.6	3.2	4.1
Gallbladder Wall	11	12	13	13
Stomach Wall	38	36	43	59
Small Intestine	22	23	26	30
LU Wall	81	89	110	140
LL Wall	31	33	40	48
Heart Wall	4.5	4.6	5.2	6.4
Kidneys	7.2	6.9	7.8	8.5
Liver	6	6.7	8	9.1
Lungs	3.8	3.8	4.4	5.3
Muscle	4.5	4.5	5	6
Ovaries	14	13	14	17
Pancreas	8.1	8.2	8.9	10
Red Marrow	5.1	5	5.2	6
Skin	2.5	2.6	3.2	3.8
Spleen	6	6	6.7	7.8
Testes	4.1	4.3	4.9	6
Thymus	3.6	3.5	4.2	5.3
Thyroid	40	41	67	81
Uterus	11	11	12	14
Remaining Tissues	4.8	4.8	5.4	6.4

6 DOSAGE FORMS, STRENGTHS, COMPOSITION AND PACKAGING

6.1 Dosage Forms

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.2 Strengths

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.3 Composition

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.4 Packaging

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.5 Post-Market Adverse Reactions

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.6 Special Precautions for Use

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.7 Drug-Drug Interactions

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.8 Drug-Behavioural Interactions

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.9 Carcinogenesis and Mutagenesis

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.10 Contamination

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.11 Radiation

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.12 Special Precautions for Inpatients

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.13 Special Precautions for Outpatients

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.14 Special Precautions for Children

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.15 Special Precautions for Geriatrics

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.16 Special Precautions for Pregnancy

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.17 Special Precautions for Lactation

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.18 Special Precautions for Breastfeeding

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.19 Special Precautions for Occupational Use

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.20 Special Precautions for Storage

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE

6.21 Special Precautions for Disposal

Read THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE